

Dr. Maciek Sznurkowski
Medical Aesthetic Expert
ms@drsznurkowski.com
mobile: +48 733 386 649



- * Médecine esthétique
- * Chirurgie esthétique
- * Thérapie laser esthétique
- * Médecine régénérative

Procédure - Intervention de retrait des coussinets adipeux de Bichat.

* procédure exclusive du Dr. Maciek Sznurkowski.

1. J'anesthésie la surface interne des joues de la patiente du côté de la cavité buccale avec une anesthésie dentaire, précisément en face des processus alvéolaires supérieurs, des sixièmes molaires.
2. En attendant l'effet complet de l'anesthésie, j'examine attentivement les surfaces des muqueuses, à la recherche de transparences jaunâtres-blanches provenant des couches plus profondes de la structure interne des joues.
3. Je réalise une incision à l'intérieur des joues avec un scalpel, en appliquant le scalpel ponctuellement aux endroits sélectionnés visuellement qui sont situés en face et au niveau des sixièmes molaires supérieures de la patiente.
4. Cela entraîne l'écoulement, aux points d'incision, de structures de tissu adipeux jaune, constituant les coussinets adipeux de Bichat.
5. À l'aide d'un aspirateur, je soulage la région de la gorge de la patiente des sécrétions et j'aspire doucement le tissu adipeux des coussinets de Bichat à partir des points d'incision.
6. À l'aide d'une pince et de ciseaux, je retire autant de tissu adipeux des coussinets de Bichat que ce qui est sorti naturellement des points d'incision réalisés précédemment avec le scalpel.
7. Après avoir coagulé les vaisseaux saignants avec une électrode bipolaire, il n'est généralement pas nécessaire de poser des points de suture. Je place une suture résorbable Vicryl 5.0 (si nécessaire).
8. Immédiatement après l'intervention, avec la patiente déjà en position assise, après avoir attendu environ 15 minutes, j'effectue une observation de contrôle des plaies postopératoires. L'absence de saignement confirme que l'intervention peut être considérée comme terminée.

